


Redosled uzorkovanja BD Vacutainer® epruvetama pri vađenju krvi

Kreirano za vašu sigurnost



= 1 inverzija



Helping all people
live healthy lives


**Prilikom vađenja
krvi uvek sledite
protokole vaše
ustanove**

Sa svim biološkim uzorcima i oštrim delovima sistema za prikupljanje krvi (lancete, igle, luer adapteri) obavezno postupajte prema pravilima i procedurama vaše ustanove. Obratite odgovarajuću medicinsku pažnju u slučaju bilo kakvog dodira sa biološkim uzorcima (npr. ubodne povrede), budući da postoji mogućnost prenošenja virusnog hepatitisa, HIV-a (AIDS) ili drugih infektivnih bolesti. Ako sistem ima ugrađeni zaštitni poklopac za iglu, koristite ga. BD ne preporučuje vraćanje korišćenih igala u zatvarač igle, ali ako su pravila vaše ustanove drugačija, poštujte vašu proceduru. Odbacite svaki sistem za vađenje krvi (igle) u kontejnere, koji su namenjeni odlaganju opasnog biološkog otpada.

BD Diagnostics - Preanalytical Systems

Redosled uzorkovanja BD Vacutainer® epruveta pri vađenju krvi i uputstvo za pravilno mešanje (inverzije)

Sve BD Vacutainer® epruvete zahtevaju mešanje inverzijom neposredno nakon vađenja krvi
Uzorke krvi treba uzimati ovim redosledom:

| Boja koda | Vrsta epruvete | Parametri | Broj inverzija prilikom mešanja |
|---------------------|---|--|---------------------------------|
| plava ljubičasta |  | Hemokultura Prvo aerobne, pa zatim anaerobne | 8-10 puta |
| svetlo plava |  | Natrijum citrat Za određivanje parametara koagulacije u plazmi | 3-4 puta |
| crna |  | ESR Za određivanje sedimentacije eritrocita | 8-10 puta |
| crvena |  | Serum Za određivanje parametara iz seruma u biohemiji | 5-6 puta |
| zlatna |  | SST™ II Advance Za određivanje parametara iz seruma u biohemiji - sa gel separatorom | 5-6 puta |
| narandžasta |  | RST Za određivanje parametara iz seruma u biohemiji - sa Trombinom i gel separatorom | 5-6 puta |
| zelena |  | Heparin Za određivanje parametara iz plazme u biohemiji | 8-10 puta |
| svetlo zelena |  | PST™ II Za određivanje parametara iz plazme u biohemiji - sa gel separatorom | 8-10 puta |
| svetlo ljubičasta |  | EDTA Za određivanje parametara iz pune krvi u hematologiji | 8-10 puta |
| roze |  | Cross Match Crossmatch epruvete za određivanje parametara u krvi kod pacijenata u transfuziji | 8-10 puta |
| siva |  | NaF/NaEDTA Za određivanje glukoze u krvi | 8-10 puta |
| teget |  | Elementi u tragovima Za određivanje elemenata u tragovima, toksikoloških i nutritivnih parametara | 8-10 puta |

Nedovoljno mešanje može dovesti do netačnih rezultata, te potrebe za ponovnim uzorkovanjem krvi REF: (CLSI H3-A6)

BD Vacutainer® distributed by:
VICOR d.o.o. Bulevar maršala Tolbuhina 42
11070 Novi Beograd
tel/fax: 011/ 30 16 492
011/ 30 16 493, 011/ 31 96 756
www.vicor.rs



BD Diagnostics
Preanalytical Systems
e-mail: EMA_PAS@bd.com